

Instrucțiuni de utilizare

Anaftin® Apă de gură

Anaftin® Apă de gură contribuie la calmarea durerii provocate de leziunile bucale minore cum ar fi cele datorate stomatitei aftoase, ulcerărilor aftoase, precum și leziunilor minore provocate de aparatele și protezele dentare. De asemenea, este indicat și pentru ulcerățiile aftoase difuze.

Mod de acțiune:

Anaftin® Apă de gură conține polivinilpirolidonă (PVP) și acid hialuronic, care formează o peliculă protectoare ce aderă la cavitatea bucală protejând zonele afectate printr-o barieră mecanică și ameliorând astfel durerea provocată de terminațiile nervoase expuse. Acidul hialuronic și *Aloe vera* din compoziție contribuie la vindecarea pe cale naturală a țesuturilor afectate.

Instrucțiuni de utilizare:

Umpleți cu apă de gură capacul dozator până la marcajul de 10 ml. Clătiți gura timp de cel puțin 1 minut, după care scuipați lichidul. Utilizați de 3 - 4 ori pe zi sau ori de câte ori este necesar. Pentru un rezultat optim, evitați să mâncați sau să beți cel puțin o oră după aplicare. În caz de înghițire accidentală a lichidului, nu sunt necesare alte măsuri suplimentare.

Compoziție:

Apă, polivinilpirolidonă (PVP), maltodextrină, propilenglicol, *Aloe barbadensis*, hidroxietilceluloză, sorbat de potasiu, benzoat de sodiu, ulei de ricin hidrogenat PEG-40, EDTA disodic, clorură de benzalconiu, hialuronat de sodiu, aromă, zaharină sodică, glicirizat dipotasic.

Precauții:

Utilizarea Anaftin® Apă de gură este contraindicată în cazul pacienților cu istoric cunoscut de reacții de hipersensibilitate la oricare dintre componente. Dacă sunteți gravidă, cereți sfatul medicului înainte de a folosi produsul. În cazul în care suferiți frecvent de ulcerății bucale, este recomandat să cereți sfatul medicului.

Atenționări și precauții:

A nu se utiliza după data de expirare sau în cazul în care flaconul pare deteriorat sau curge. A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. A se păstra la temperatura camerei, ferit de căldura directă. A nu se congela.

Conține:

120 ml

Fabricant: Alliance Pharma Srl, Viale Restelli 5, 20124 Milano, Italia **CE 0477**

Distribuit de BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Glienicke Weg 125, 12489 Berlin, Germania

Rev 09/2016

BC logo